

Huellas de descarnado en el Paleolítico Superior : la Cueva de El Castillo (España)

Paulino PUMAREJO-GOMEZ y Victoria CABRERA-VALDEZ

El estudio de las marcas encontradas en los huesos, fundamentalmente en forma de cortes o incisiones, provee un importante campo de contraste de las técnicas de descuartizamiento y carnicería de un animal. Este tipo de estudios, ha sido utilizado desde hace mucho tiempo como prueba de las actividades antrópicas sobre restos óseos (Lartet, 1860; Dart, 1957; Clark, 1972). Sin embargo, es el trabajo de Binford (1981) el que plantea la necesidad de un estudio sistemático de las marcas y cortes sobre los huesos. Hasta hace poco tiempo este tema ha sido uno de los menos tratados por los investigadores, si bien cabe destacar los estudios realizados también por Albrecht, Berke & Poplin (1983), Lyman (1987) y, los recientemente realizados en nuestro país, por Reixach (1986).

El material óseo que presentamos en este artículo forma parte de la Tesis Doctoral de uno de nosotros (P.P.) basada en tres yacimientos paleolíticos de Cantabria : El Castillo (Puente Viesgo), El Juyo (Igollo) y La Pila (Cuchia). La elección de estos yacimientos está justificada por varios motivos. En primer lugar, se tratan todos ellos de yacimientos en cueva excavados recientemente o en curso de excavación, por lo que ha sido sistemática la recogida de sus materiales. Por otro lado, las nuevas técnicas de recogida de restos vegetales aplicadas en estos yacimientos testifican la importancia que las actividades cinegéticas tuvieron para sus ocupantes. Al mismo tiempo, se intenta trabajar con una secuencia amplia del Paleolítico Superior Cantábrico en la que poder observar, si las hubiera, diferencias temporales entre sus complejos culturales.

1. Hipótesis de partida

En síntesis, la finalidad de todo el trabajo parte de una serie de premisas, si bien esta comunicación se basa en la constatación de las dos primeras :

- La primera hipótesis contempla la posibilidad de la existencia de diferentes tipos de incisiones y de distintas localizaciones anatómicas de las mismas, dependiendo del trabajo realizado sobre el animal desde su abatimiento hasta su consumo, entendiendo como cadena técnica de aprovechamiento la sucesión de las siguientes actividades : separación de la piel → despiece → desarticulación → descarnado → fracturación.
- En segundo lugar, se establece que la posición anatómica de las incisiones, si han sido provocadas por el aprovechamiento económico de la pieza, ha de ser coherente con las actividades realizadas. Ello las diferenciará de las marcas producidas por animales, raíces, etc. Así aparecerán, principalmente, en las zonas de inserción de tendones y ligamentos, cerca de las epífisis óseas, lugares donde hay que incidir para despiezar y desarticular los miembros.
- Como tercera hipótesis se trata de ver la posible relación, por un lado, entre la edad de los animales cazados y, por otro, las partes anatómicas de animal que aparecen en el yacimiento, y la presencia o no de incisiones sobre los huesos.
- En cuarto lugar, y como ampliación de la hipótesis anterior, se plantea la posible relación entre la localización geográfica del yacimiento y el transporte de la caza al mismo.
- Como quinta hipótesis se plantea la posibilidad de encontrar diferentes modelos de despiece desde un punto de vista sincrónico, según la especie cazada y el área geográfica, y desde una perspectiva diacrónica, según el complejo cultural que se examine.
- En último lugar, se tiene en cuenta la posible existencia de una distribución especial de los restos con incisiones sobre la superficie de los niveles de ocupación, como resultado de la distribución del espacio de habitación según las actividades realizadas en él.

2. Un caso de estudio : la cueva de El Castillo (Puente Viesgo)

El presente trabajo está realizado sobre un muestreo aleatorio entre los restos óseos del nivel basal del Auriñaciense de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo), en curso de excavación y de estudio. Este análisis va encaminado a fijar los criterios del modelo observado en los niveles del Magdaleniense Superior y Azilienses de la cueva de la Pila. Con ello se intenta observar si existe un cambio de comportamiento entre dos momentos culturales diferentes, uno del inicio y otro del final que pueden encuadrar la evolución del hábito, si lo hubiere, a lo largo del Paleolítico Superior.

Después de haber analizado un gran número de restos óseos de la cueva de La Pila (Cuchía, Cantabria), cuya estratigrafía permite conocer en detalle la transición Magdaleniense Aziliense del Cantábrico (Bernaldo de Quirós *et al.*, 1992), los resultados que hemos obtenido, en lo que a morfología y situación anatómica de las incisiones se refiere, son similares a los de los estudios de los que hemos partido.

Hemos sistematizado las incisiones en varios «modelos» señalando las características de las incisiones y su relación con la situación anatómica según el tipo de hueso de que se trate, sin diferenciar niveles arqueológicos ni especies animales, con el fin de poder tener unos primeros resultados para poder enfocar nuestra tarea de investigación (Pumarejo & Bernaldo de Quirós, 1990).

Con el fin de comprobar si los modelos obtenidos se repiten en otros yacimientos de características diferentes al que estamos estudiando, y moviéndonos, principalmente, en el campo de las dos primeras hipótesis, hemos intentado aplicar el análisis a una muestra amplia de los restos paleontológicos de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) logrando resultados positivos.

El Castillo, representa un enclave excepcional como cazadero. Domina el ancho valle del Pas formando un cerrojo con el monte frontal que pertenece al mismo sistema del Dobra. Al mismo tiempo, desde el yacimiento a unos 130 m sobre el reco puede rodearse el monte alcanzando dos valles transversales mas angostos, con cursos fluviales, que remontándolos se llega al valle del Besaya.

Siguiendo el curso del Pas se alcanza la costa, a unos 25 km. En la desembocadura el biotopo es diferente, formándose ensenadas y medios de

dunas frente al sistema kárstico donde se ubica la cueva de la Pila.

La comparación del modelo, por lo tanto es importante ya que entrecruza no sólo dos momentos culturales diferentes, ambos de transición, sino también dos yacimientos con entornos muy diferentes aunque muy próximos y pertenecientes a la misma cuenca fluvial.

Los restos óseos de El Castillo estudiados pertenecen a la unidad estratigráfica (18b2, 18c y 19 sup.) que se está excavando en la actualidad y para la cual se han obtenido dataciones por el acelerador de partículas que rodean los 40 000 años (Cabrera & Bischoff, 1989).

La cantidad de la muestra analizada es inferior a la procedente de la cueva de la Pila, como se muestra en la tabla 1.

	TFE	RFA	TRI
La Pila	> 9 000	4 800	1 500
Castillo	20 000	2 000	400

TFE : Total Estimado de restos de Fauna;
RFA : Restos de Fauna Analizados;
TRI : Total Restos con Incisiones.

Tabla 1

Existen diferencias en la proporción entre ambos yacimientos entre las incisiones halladas y los restos de fauna analizados (La Pila : 31,25 %; El Castillo : 20 %). El porcentaje es muy alto en ambos, para la muestra analizada hasta el momento.

En El Castillo hemos encontrado los determinados tipos de incisiones distribuidos en las siguientes partes del esqueleto procedentes en su mayoría de restos de *Cervus elaphus*.

2.1. Cráneo

Los cráneos muestran incisiones cortas y paralelas en la superficie de los temporales, derivadas de la separación de la piel, y en el diastema del maxilar.

2.2. Mandíbulas y maxilares

Las mandíbulas y los maxilares pueden presentar incisiones largas transversales y oblicuas en la zona alveolar, tanto en su cara interna como en la externa, en grupos generalmente de dos a cinco cortes aunque no falten los ejemplos con mayor frecuencia (fig. 1 : 1-2). Es probable que las marcas de la cara interna de las mandíbulas




Fig. 1 — Restos craneales.

estén relacionadas con la extracción de la lengua del animal y que las de la externa se hayan producido al cortar el músculo bucinador.

En las ramas ascendentes se observan incisiones en el cóndilo mandibular o muy cerca de él, generalmente en la cara externa, de delineación transversal u oblicua, de pequeño tamaño y paralelas entre sí (fig. 1 : 3-4). Son cortes realizados para seccionar el músculo masetero — uno de los músculos básicos para el cierre de la mandíbula — y los ligamentos lateral y caudal de la articulación mandibular que unen la mandíbula con el arco cigomático. Estos cortes permiten separar la mandíbula inferior de la fosa temporal y por lo tanto, del resto de la cabeza.

También pueden encontrarse incisiones cortas o largas, transversales y oblicuas alrededor del foramen del mentón como consecuencia de los cortes dados para separar del hueso la región mentoniana.

2.3. Vértebras torácicas

En la base de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas suelen aparecer incisiones indistintamente en una u otra cara e incluso en las dos (fig. 2 : 1-2). De orientación oblicua y de tamaño irregular, se encuentran en grupos de dos a cinco cortes paralelos entre sí, aunque hay algunos grupos más numerosos. Su situación nos hace pensar en que se han producido al realizar cortes para extraer el lomo.




Fig. 2 — Restos postcraneales.

2.4. Costillas

Muestran incisiones transversales u oblicuas paralelas en ambas caras o en una de ellas en la zona mesial (fig. 2:3). Generalmente son de pequeño tamaño y se asocian en grupos de dos a cinco o a veces mayores. Las incisiones de la cara externa se originan, dependiendo del lugar que ocupe la costilla, bien por los cortes que han de realizarse para desconectar el miembro anterior del tronco cortando el músculo serrato o tal vez el músculo extensor

grueso del antebrazo (tríceps), o bien en el descarnado.

En algunas costillas se aprecian incisiones en la cabeza articular con la finalidad de desarticular estos huesos de la columna vertebral.

2.5. 2.5. Omóplatos

En estos huesos se observan incisiones transversales, cortas y paralelas, en el borde inferior del cóndilo y en el cuello de la escápula. A veces tienen marcas longitudinales,

transversales u oblicuas, de tamaño variable, paralelas o subparalelas, a lo largo de la base de la espina, en la cara externa, tanto en la fosa supraspinosa como en la infraspinoza (fig. 2:4).

Las incisiones del cuello de la escápula se localizan en la zona de inserción de biceps, que ha sido cortado para poder separar del tronco el miembro anterior. Las marcas de las fosas supra e infraspinoza, de morfología diferente, nos indican la realización de un trabajo de descarnado en el omóplato.

2.6. Húmeros

Hasta el momento sólo hemos identificado incisiones en las epífisis distales de los húmeros. Se trata de marcas transversales, cortas y paralelas, en grupos de dos a cinco cortes, que se sitúan en los cóndilos laterales, en las caras externa e interna (fig. 3:3).

Estos cortes se originan al desarticular el miembro anterior separando el húmero del radio, cortando por la cara externa el ligamento colateral del codo y por la interna el ligamento colateral medial del codo.

2.7. Cúbitos

Incisiones oblicuas en la zona proximal, en una o en las dos caras, en la superficie del olecráneo y cerca de la muesca semilunar, en grupos de dos a cinco, siendo paralelas entre sí.

Las marcas de la superficie del olecráneo de la cara externa se deben a la separación de este hueso del húmero cortando los músculos corto y mediano del antebrazo. Y los cortes de la muesca semilunar en la cara interna y externa se efectúan al separar la ulna del radio incidiendo sobre el ligamento radiocubital transverso medial y transverso lateral respectivamente.

2.8. Tarsales

De los huesos tarsales, por ahora, sólo tenemos identificadas incisiones en el escafocuboides, situadas en las caras interna. Son transversales, cortas y paralelas entre sí, en grupos de dos a cinco marcas. Su origen está en la separación de los huesos tarsales al incidir sobre los ligamentos largo interno y externo.

2.9. Metacarpos y metatarsos

En ambos huesos se encuentran los mismos tipos de incisiones (fig. 3 : 2-5). En las epífisis proximales hay marcas transversales cortas y paralelas, en la cara anterior y en los laterales, que se han realizado al cortar en la pata delantera los ligamentos colateral lateral y colateral medial de la articulación intercarpiana, que unen el metacarpo con el radio, y en la pata trasera los ligamentos largo interno y largo externo, que unen el metatarso y la tibia.

En el extremo distal encontramos incisiones en las cuatro caras, todas ellas cortas, aunque puede haberlas largas, transversales y paralelas. Las de las caras interna y externa de ambos huesos se sitúan en el lugar donde se insertan el ligamento sesamoideo colateral lateral y el ligamento colateral lateral del menudillo, que unen el metacarpo y el metatarso con la primera falange de cada extremidad. Las marcas de la cara anterior se han originado al cortar el tendón del músculo extensor anterior de las falanges, y las de la cara posterior al seccionar el músculo flexor superficial.

2.10. Primeras falanges

Marcas transversales, cortas y paralelas en la zona proximal de la cara interna y externa, derivadas de los cortes dados a los ligamentos que unen la primera falange con el metacarpo y metatarso. A veces también se encuentran en la cara posterior por haberse cortado los ligamentos distales o sesamoideos inferiores (fig. 3:2).

En la epífisis distal puede haber incisiones transversales, cortas y paralelas en la cara interna o externa, de haber cortado el ligamento cuartilla-carclago alar para separar esta falange de la siguiente.

Es probable que algunas de las incisiones que aparecen en las primeras falanges se hayan producido al separar la piel pues, en estas zonas, se encuentra en contacto directo con el hueso.

2.11. Diáfisis

Por tratarse de fragmentos óseos no identificables resulta difícil precisar la situación de las incisiones, pero teniendo en cuenta la delimitación de las fibras que los forman se observa que la gran mayoría de ellas son oblicuas o longitudinales, siendo escasas las transversales. Su longitud es mayor que la del resto de las incisiones y generalmente son paralelas o




Fig. 3 — Restos axiales.

subparalelas. Estas marcas se derivan del trabajo de descarnado de los huesos largos.

3. Conclusiones

Al comparar los tipos de incisiones observados hasta el momento en las cuevas de El Castillo y de La Pila, se aprecia que en primero de estos yacimientos faltan algunos de los tipos de incisiones sistematizados en el segundo (Pumarejo & Bernaldo de Quirós, 1990).

Así en los niveles aurifiacienses de El Castillo por el momento no se han visto incisiones en vértebras cervicales, pélvis, fémures, tibias, calcáneos, astrágalos ni gran cuneiforme.

Esta diferencia podría ser producto de la distancia cronológica que separa estos dos yacimientos y del resultado de un distinto aprovechamiento de la caza en los momentos iniciales del Paleolítico Superior Cantábrico (El Castillo) y en los finales (La Pila). En principio, puede explicarse por la reducida

cantidad de restos paleontológicos analizados hasta el momento en El Castillo, por tratarse de un primer muestreo que nos ayude a enfocar nuestro posterior trabajo de investigación. Sin embargo, tenemos que valorar otros factores que pueden influir en la carencia de determinados tipos de incisiones.

3.1. Causas tafonómicas y conservación diferencial

En primer lugar la observación de las incisiones depende del estado de conservación del hueso, pudiendo haber zonas o niveles del yacimiento en los que éste se conserve peor que en otras.

Por otro lado influye la propia conservación diferencial de los restos óseos, que depende directamente de la parte del esqueleto de la que se trate. Ello puede darnos una visión sesgada de la realidad, al no mostrarse algunos de los tipos de incisiones típicos por la destrucción del material se produce el riesgo de interpretar su falta por la no realización en el yacimiento de alguna de las tareas propias del aprovechamiento animal (separación de la piel, despiece, desarticulación, descarnado).

Algunos huesos, por su dureza y tamaño, soportan mejor que otros los procesos que pudieran destruirlos durante su manipulación (desarticulación, despiece, etc.) tales como falanges, articulaciones y epífisis de huesos largos, frente a otros de mayor tamaño y fragilidad como cráneos, mandíbulas, omóplatos y pelvis, que pueden romperse fácilmente. Además estos dos grupos de huesos también presentan, lógicamente, mayor o menor facilidad a deteriorarse con procesos de incidencia posterior a la deposición, como el pisoteado, la compactación de los sedimentos, etc.

Además, hay que tener en cuenta la posible influencia de factores físico-químicos y biológicos que hayan actuado después de la deposición del registro arqueológico (calcificación, carnívoros, raíces).

3.2. Causas antrópicas

Otro factor que puede aclararnos este tema es la posible existencia de una selección de las partes anatómicas de los animales aportadas al yacimiento en función, por un lado, de su valor alimenticio, y por otro, de la facilidad de transporte de las piezas abatidas según su tamaño y la distancia a la que han sido cazadas.

También hay que valorar la composición de la materia prima lo que puede hacer que las incisiones estén más marcadas o no. En este sentido se ha detectado que en el nivel 18b2 las huellas observadas carecen de microsurco, y asimismo la huella es suave. En este nivel la abundancia de piezas líticas en caliza negra asociadas es apreciable por lo que pudiera deberse a este factor, dada la menor dureza de esta materia prima.

En el nivel 18c, en donde la caliza negra alóctona también es abundante, se reproduce el mismo hecho. Sin embargo en el nivel 19 superior, donde apenas si se detecta caliza entre la industria lítica incluidos los debris de 2 mm, las huellas están muy marcadas. La correlación por tanto es muy neta, por lo que el estudio de la asociación espacial de la industria lítica y los restos de fauna adquiere mayor relieve en este campo. Este estudio podrá determinar si se debe a un factor aleatorio, dependiendo del momento y la materia al alcance o bien, si se debe a una distribución debida a distintas actividades dentro de la ocupación.

También hay que contar con la posible diferencia de la fuerza impresa con la que se ha realizado el gesto manual.

Aunque pueda ser prematuro hacer conclusiones se pueden destacar algunas ideas que de momento afianzan nuestras hipótesis de partida. En primer lugar, parece que nuestras hipótesis sobre la existencia de diferentes tipos de incisiones y de distintas localizaciones anatómicas dependiendo del trabajo realizado sobre el animal, y la coherencia de su posición anatómica en función de los puntos de inserción de tendones y ligamentos, se va confirmando a medida que analizamos un mayor número de restos óseos.

La tarea de separación de la piel ha dejado huellas en aquellas regiones anatómicas donde la piel se encuentra más en contacto con los huesos como en el caso de los cráneos y primeras falanges.

El despiece ha dejado marcas en los omóplatos por el desmembramiento de las extremidades anteriores.

Las labores de desarticulación, que cortan tendones y ligamentos, han incidido sobre las zonas cercanas de las epífisis del húmero, del cúbito, del metacarpo y metatarso, en las mandíbulas, en el cuello del omóplato y en las articulaciones de las costillas.

Por último, el descarnado se aprecia en las diáfisis de los huesos largos, en los cuerpos de las costillas, en las fosas supra e infraspinosas de los omóplatos y en las apófisis espinosas de las vértebras.

Nos parece interesante el hecho de que se repitan en en los niveles aurinienses de la cueva de El Castillo la práctica totalidad de los «modelos» de incisiones definidos en los niveles magdalenienses y azilienses de La Pila, en dos yacimientos de áreas geográficas y de complejos culturales diferentes, lo que nos indicaría en principio la posibilidad de que no hubiera durante el Paleolítico Superior Cantábrico una diferenciación ni geográfica ni temporal en las labores de carnicería, manteniéndose un pauta común prácticamente hasta la actualidad.

En el futuro, el análisis se irá completando con los restos procedentes del Paleolítico Medio e Inferior de la gran secuencia de la cueva de El Castillo que alcanza cronologías rissiensis (Cabrera, 1984). De esta manera es posible que en el futuro conozcamos mejor los distintos estadios de la cadena técnica de aprovechamiento de los restos de fauna a lo largo de un espectro muy amplio de tiempo, en una región determinada.

Bibliografía

- ALBRECHT G., BERKE H. & POPLIN F., 1983. *Recherches scientifiques sur les inventaires Magdaléniens du Petersfels, fouilles 1974-1976*. Verlag Archaeologica Venatoria, Universität Tübingen.
- BERNALDO DE QUIRÓS F., 1980. *Notas sobre la economía del Paleolítico Superior*. Centro de Investigación y Museo de Altamira, Monografía 1. Santander.
- BERNALDO DE QUIRÓS F., GUTIERREZ C., HERAS C., LAGÜERA M. A., PELAYO M., PUMAREJO P. & UZQUIANO P., 1992. Nouvelles données sur la transition Magdalénien supérieur/Azilien : la cueva de «La Pila» (Cantabria, Espagne). In : *Le peuplement magdalénien. Paléographie physique et humaine. Colloque de Chancelade, 10-15 octobre 1988*. Paris, C.T.H.S. : 259-269.
- BINFORD L. R., 1981. *Bones. Ancient men and modern myths*. Studies in Archaeology. New York.
- CABRERA V., 1984. *El Yacimiento de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Santander)*. Bibliotheca Praehistorica Hispana XXII. Madrid, C.S.I.C.
- CABRERA V. & BISCHOFF J., 1989. Accelerator 14C dates for Early Upper Paleolithic (Basal Aurignacian) at El Castillo Cave (Spain). *Journal of Archaeological Science*, 16 : 577-584.
- CLARK J. G. D., 1972. Palaeolithic butchery practices. In : P.J. Ucko, R. Thrigam & G.W. Dimberley (ed.), *Man, Settlement and Urbanism*. Londres, Duckworth : 149-156.
- DART R., 1957. *The osteodontokeratic culture of Australopithecus Prometeus*. Transvaal Museum Memoir, 10. Pretoria.
- LARTET E., 1860. On the coexistence of man with certain extinct quadrupeds, proved by fossil bones, from various Pleistocene deposits, bearing incisions made by sharp instruments. In : Heizer (ed.), *Man's discovery of his Past*.
- LYMAN R. L., 1987. Archaeofaunas and Butchery Studies: A taphonomic Perspective. *Advances in archaeological method and theory*. New York, 10 : 249-337.
- PUMAREJO P. G., e.p. Restos óseos con incisiones en la Cueva de A. Valiña (Lugo). Notas para su estudio. In : M.J. Soto Barreiro & C. Llana, *Cova da Valiña (Castroverde, Lugo). Un yacimiento del Paleolítico Superior Inicial en Galicia (Camañas de 1987 y 1988)*. Xunta de Galicia.
- PUMAREJO P. G. & BERNALDO DE QUIRÓS F., 1990. Huellas humanas en huesos. Análisis de sus implicaciones económicas (I). *Revista de Arqueología*, 108 : 16-24.
- PUMAREJO P. G. & BERNALDO DE QUIRÓS F., 1990. Huellas humanas en huesos. Análisis de sus implicaciones económicas (II). *Revista de Arqueología*, 109 : 14-24.
- REIXACH CASALS J., 1986. Huellas antrópicas. Metodología, diferenciación y problemática. *Revista de Arqueología*, 60 : 6-14.

Dirección :

Paulino PUMAREJO-GOMEZ
Victoria CABRERA-VALDEZ
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Departamento de Prehistoria
Bravo Murillo, 38
E-28080 Madrid (España)